تأثیر التهاب در افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قبلی- عروقی در مبتلایان به رماتیسم مفصلی

امیر حسین مؤدب
دانشجوی سال دوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اخیراً محققان کلینیک Moyo دریافته‌اند که التهاب سیستمیک همراه با رماتیسم مفصلی دلیل اصلی افزایش خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در مبتلایان به رماتیسم مفصلی می‌باشد.

دکتر کرمرز (Kremers) محقق و پژوهشگر دپارتمان تحقیقات علوم تندرستی در بارهٔ این یافته‌های جدید می‌گوید: «ما معتقدیم که التهاب یک عامل تشدید کنندهٔ بروز بیماریهای قلبی- عروقی در مبتلایان به رماتیسم مفصلی که دچار تورم مفاصل، التهاب عروقی خونی، رماتیسم زیوی یا میزان بالای ESR می‌باشند، خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی بیشتر است.

براساس تحقیقاتی که پیشتر انجام شده است، مبتلایان به رماتیسم مفصلی بیش از سایر افراد در معرض خطر مرگ زود هنگام قرار دارند و بیماریهای قلبی- عروقی عمده‌ترین علت مرگ و میر در این افراد می‌باشد.

یافته‌های حاصل از این مطالعه نیز مؤید یافته‌های پیشین می‌باشد. این که چگونه تورم و التهاب همراه رماتیسم مفصلی منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی می‌شود، نامشخص است. فرضیه‌های محققان این است که در صورت نظارت و کنترل دقیق شدت و میزان التهاب مفاصل در مبتلایان به رماتیسم مفصلی سبب کاهش خطر مرگ و میر در آنان می‌شود.

Reference:

Arthritis & Rheumatism, issue March 21, 2005.

[Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2026-11-06]