

## احتمال خطرناک بودن برخی از ضایعات بافت

### پستان

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در شماره مارس نشریه انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی به چاپ رسیده است برخی از ضایعات بافت پستان که در بیوپسی سوزنی حالت خوش خیم از خود نشان می‌دهند در جراحی‌ها سرطانی بوده و باید از بافت پستان خارج شوند.

دکتر مرکا دو (Mercado) که مجری این پروژه و استاد رادیولوژی مرکز پزشکی نیویورک است در باره نتایج حاصل از این مطالعه می‌گوید: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برای جلوگیری از بروز سرطان پستان باید ضایعات پاییلاری از طریق جراحی برداشته شوند. ضایعات پاییلاری رشد غیر عادی اما خوش خیم سلولها در مجرای پستان می‌باشد. این ضایعات در برگزیده ۱ تا ۳ درصد همه نمونه‌گیری‌هایی است که بوسیله بیوپسی سوزنی انجام می‌شود. در حال حاضر درمان رایج این ضایعات بر اساس نظر پزشک، پیگیری رادیوگرافیک و یا حذف ضایعه از طریق جراحی می‌باشد. تاکنون نحوه برخورد با ضایعات خوش خیم پاییلاری مورد مناقشه بوده و اکثراً بر اساس شواهد روایی و یا تحقیقات محدود انجام شده، بوده است و هیچگونه روش مشخصی در باره نحوه برخورد با این ضایعات منتشر نشده است.

نتایج به دست آمده نشان دهنده بروز قابل توجه ductal carcinoma in situ و atypical ductal hyperplasia در زنانی است که بیشتر ضایعات پاییلاری خوش خیم در آنها از طریق بیوپسی سوزنی تشخیص داده شده بود. دکتر مرکا دو تصریح می‌کند که: «بنابر این تمامی ضایعات پاییلاری خوش خیم باید از طریق جراحی برداشته شوند تا از بروز میزان قابل توجهی از ضایعات غیر تیپیک و بدخیم جلوگیری به عمل آید.

### Reference:

North American Journal of Radiology, 2006.

مناصالحی پورفان  
دانشجوی سال دوم پزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی کردستان