
# احتمال خطرناک بودن برخی از ضایعات بافت پستان



مسا صالحی پوریان
دانشجوی سال دوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در شمارهٔ مارس نشریهٔ انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی به چاپ رسیده است برخی از ضایعات بافت پستان که در بیوپسی سوزنی حالت خوش خیم از خود نشان می‌دهند در جراحی‌ها سرطانی بوده و باید از بافت پستانخارج شوند.

دکتر مرکا دو (Mercado) که مجری این پروژه و استاد رادیولوژی مرکز پزشکی نیویورک است در بارهٔ نتایج حاصل از این مطالعه می‌گوید: «بررسیهای ما نشان می‌دهد که برای جلوگیری از بروز سرطان پستان باید ضایعات پاپیلاری از طریق جراحی برداشته شوند. ضایعات پاپیلاری رشد غیر عادی اما خوش خیم سلولها در مجرای پستان می‌باشد. این ضایعات در برگیرندهٔ ۱ تا ۳ درصد همهٔ نمونه‌گیریهایی است که بوسیلهٔ بیوپسی سوزنی انجام می‌شود. در حال حاضر درمان رایج این ضایعات بر اساس نظر پزشک، پیگیری رادیوگرافیک و یا حذف ضایعه از طریق جراحی می‌باشد. تاکنون نحوهٔ برخورد با ضایعات خوش خیم پاپیلاری مورد مناقشه بوده و اکثراً بر اساس شواهد روایی و یا تحقیقات محدود انجام شده، بوده است و هیچگونه روش مشخصی در بارهٔ نحوهٔ برخورد با این ضایعات منتشر نشده است.

نتایج به دست آمده نشان دهندهٔ بروز قابل توجه ductal carcinoma in situ و atypical ductal hyperplasia در زنانی است که پیشتر ضایعات پاپیلاری خوش خیم در آنها از طریق بیوپسی سوزنی تشخیص داده شده بود. دکتر مرکا دو تصریح می‌کند که: «بنابر این تمامی ضایعات پاپیلاری خوش خیم باید ازطریق جراحی برداشته شوند تا از بروز میزان قابل توجهی از ضایعات غیر تیپیک و بدخیم جلوگیری به عمل آید.

**Reference:**
North American Journal of Radiology, 2006.



[ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2026-11-06 ]