

سودمندی درمانهای معمول در درمان پوکی

استخوان در مردان مبتلا به سرطان پروستات

بر اساس مطالعه انجام شده در مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی بطرزبورگ، به کارگیری روشهای درمان پوکی استخوان که عموماً در زنان به کار می‌روند در بهبود وضعیت مردان مبتلا به سرطان پروستات که سابقه ابتلا به پوکی استخوان را دارند مؤثر می‌باشد.

مردان مبتلا به سرطان پروستات که تحت درمان محرومیت آندروژن (androgen deprivation therapy) قرار می‌گیرند دچار کاهش شدید دانسیته استخوانی شده و خطر بروز شکستگی‌های استخوانی در آنها بیشتر می‌باشد.

در مطالعه انجام شده، برای کاهش اثرات مخرب این روش درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات از داروهای خوراکی alendronate استفاده شد. نتایج مطالعه نشان دهنده افزایش واضح میزان دانسیته استخوانی در مردانی بود که از این دارو استفاده می‌کردند.

آمار بالای ابتلا به سرطان پروستات نشان دهنده اهمیت فراوان نتایج حاصل از این مطالعه در پیشگیری از افزایش میزان بروز آسیبهای استخوانی ناتوان کننده می‌باشد. بر اساس نتایج این مطالعه مردانی که تحت درمان سرطان پروستات هستند باید آزمایش تعیین میزان دانسیته استخوانی را انجام دهند تا در صورتی که در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان قرار دارند از روشهای درمانی محافظت کننده بافت استخوانها استفاده نمایند.

Reference:

American society of clinical oncology, prostate cancer symposium, 2006.

امیر حسین بوداب
دانشجوی سال دوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان