اثر sibutramin در کاهش وزن

چاقی یکی از عوامل افزاینده ریسک فاکتورهای متابولیک و قلبی عروقی است، در پی همین مسئله نیزنخستین هدف کاهش وزن، پیشگیری از بیماری و مرگ ومیر ناشی از چاقی است.نتایج باز نگری سیستماتیک ۲۹ مطالعه مداخله‌ای تصادفی شده همراه با آنالیز داده‌های حاصل از آن بیانگر تفاوت معنی داری بوده که این تفاوت در مطالعات سه ماهه ویک ساله بارزتر است.

یکی از مطالعات نشان داده کهsibutramin در مقایسه با دارونما،کاهش وزن را در طول دو سال به نحو موثری حفظ می‌کند که البته با افزایش متعادلی در ضربان قلب و فشار خون و افزایش اندکی در سطح کلسترول و تری گلیسرید همراه است،و نیز منجر به افزایش کمی در میزان قند خون افراد دیابتی می‌گردد.اما در نتایج این مطالعه هیچ گونه شواهد مستقیمی مبنی بر کاهش مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از چاقی طی مصرفsibutramin بدست نیامده است. بنابرین می‌توان گفت که این دارو در کاهش وزن اثرات چشمگیری دارد که از طرف دیگر با تغییرات مثبت و منفی در ریسک فاکتورهای متابولیک وقلبی عروقی همراه است.

ثریا ارژن
دانشجوی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

[Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2026-11-22]