

تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم در طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶

احمد کچویی^۱، سعید مدنی^۱، مصطفی واحدیان^۲، فاطمه امیرکانیان^۲، عنایت‌اله نوری^{۳*}، محمد مهدی شاطر^۴،
مریم بلیغی^۳

۱- گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۲- واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۳- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۴- گروه جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

(مؤلف مسؤول): پست الکترونیک: Enoori@muq.ac.ir

کد ارکید: <https://orcid.org/0000-0002-4457-129X>

چکیده

زمینه و هدف: کله سیستیت حاد یکی از شایع ترین مشکلات جراحی در بین مبتلایان به دردهای شکمی است. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی US در تشخیص کله سیستیت حاد با توجه به یافته‌های حین عمل و یافته‌های پاتولوژیکی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم در طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بود.

مواد و روش کار: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی بوده است. جامعه‌ی آماری را تمامی بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد که طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به بیمارستان شهید بهشتی مراجعه کرده و تحت کله-سیستکتومی قرار گرفته‌اند، تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری بود. بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه (سن، جنس، نتیجه‌ی سونوگرافی، نتیجه‌ی آزمایش پاتولوژی، وجود سنگ صفراوی، سیرکله سیستکتومی و جراحی اورژانس یا الکتیو) از پرونده‌های مربوطه استخراج و وارد چک لیست شدند. با استفاده از نرم‌افزار آماری MED cal نسخه‌ی ۱۸/۹ حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری تشخیص کله سیستیت حاد توسط سونوگرافی محاسبه شده و دامنه‌ی اطمینان ۹۵٪ برای شاخص‌های تشخیصی گزارش گردید.

یافته‌ها: ۳۱ نفر (۳۱٪) مرد و ۶۹ نفر (۶۹٪) زن مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی این بیماران $53/62 \pm 12/27$ بود. در ۸۹ بیمار (۸۹٪) وجود سنگ صفراوی گزارش شده بود. در ۵۶ نفر (۵۶٪) یافته‌های پاتولوژی مثبت و در ۴۴ نفر (۴۴٪) یافته‌های پاتولوژی منفی گزارش شد. میزان حساسیت و ویژگی سونوگرافی به ترتیب ۸۲/۱٪ و ۹۰/۱٪ برآورد شد. ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران به ترتیب ۹۲٪ و ۸۰٪ و صحت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران ۸۶٪ برآورد شد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، می‌توان گفت سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد در بیماران از دقت تشخیصی بالایی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: کله سیستیت حاد، صحت تشخیصی، سونوگرافی

مقدمه

کله سیستیت حاد یا التهاب حاد کیسه‌ی صفرا یکی از شایع‌ترین مشکلات جراحی در بین مبتلایان به دردهای شکمی است (۱، ۲). این عارضه شایع‌ترین علت درد شکم در ربع فوقانی راست می‌باشد (۳). ۹۰-۹۵٪ بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد دارای سنگ‌های صفراوی هستند؛ که از این حالت ممکن است مشکلات ثانویه مانند انسداد در مجرای صفراوی، افزایش فشار داخل لومن، انقباض کیسه‌ی صفرا و تحریک دیواره‌ی کیسه‌ی صفرا به واسطه‌ی محصولات ناشی از تجزیه و تحلیل صفرا، عفونت و یا پروستاگلندین‌ها ایجاد گردد (۴). از جمله علائم کله سیستیت حاد می‌توان به درد ربع فوقانی راست شکم، که ممکن است به شانه‌ی راست یا پشت کشیده شود، تب و لکوسیتوز اشاره کرد (۵). علائم مشابهی ممکن است در ربع فوقانی راست مشاهده شود که در تشخیص کله سیستیت حاد می‌تواند گمراه کننده باشند؛ از میان آن‌ها می‌توان به آپاندیسیت، پانکراتیت، هپاتیت، ایسکمی قلبی و پنومونی اشاره کرد (۵، ۶). با این حال، ارزیابی بیش از یک سوم از بیماران که در ابتدا مشکوک به کله سیستیت حاد هستند با روش‌های تشخیصی تصویربرداری است (۷). استفاده از روش‌های تصویر برداری به تشخیص صحیح کله سیستیت حاد کمک کرده و زمان تشخیص را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، احتمال بروز عوارض ناشی از بیماری را نیز کاهش می‌دهد. درصد قابل توجهی از این بیماران دچار عوارضی از جمله هیدروپس کیسه‌ی صفرا، کله سیستیت گانگرنه، سوراخ شدن کیسه‌ی صفرا و پریتونیت می‌شوند (۸). همچنین عوارضی مانند کله سیستیت انسدادی و سوراخ شدن به وسیله‌ی روش‌های تصویربرداری قابل تشخیص هستند (۹). با وجود اینکه تاخیر در تشخیص باعث ایجاد عوارض می‌گردد،

تشخیص این بیماری در اغلب موارد مبهم بوده و نیاز به بررسی‌های تصویربرداری تشخیصی جامع‌تری با هزینه‌ی بیشتر دارد (۱۰). سونوگرافی به روش اولتراسوند به عنوان شیوه‌ی اول تصویربرداری در تشخیص کله سیستیت حاد مطرح است (۱۱)؛ زیرا دسترسی به این روش آسان بوده و بیمار در معرض پرتوهای یونیزان قرار نمی‌گیرد (۱۲). حساسیت و ویژگی اولتراسوند به ترتیب از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ و از ۳۳٪ تا ۱۰۰٪ گزارش شده است. علاوه بر آن، استفاده از سی تی اسکن در ارزیابی کله سیستیت حاد رو به افزایش است (۱۳). با توجه به اینکه کله سیستیت حاد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جراحی عمومی است، مطالعات بسیاری نشان داده است که کله سیستکتومی زودرس نتایج خوبی داشته، باعث کوتاه‌تر شدن مدت اقامت در بیمارستان شده و هزینه‌های بهداشت و درمان را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، لازم است تشخیص این بیماران زود هنگام باشد. با توجه به اهمیت روش‌های تصویربرداری از جمله سونوگرافی و سی تی اسکن در تشخیص صحیح کله سیستیت حاد، هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص این بیماری با توجه به یافته‌های حین عمل و یافته‌های پاتولوژیکی بود.

مواد و روش کار

مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی (cross sectional) بود که برای تعیین ویژگی و حساسیت سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم در طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ انجام شد. حداقل حجم نمونه‌ی لازم برای این مطالعه با استفاده از فرمول مطالعات تعیین حساسیت و ویژگی، با در نظر گرفتن نتایج مطالعات مشابه ۸۰٪ حساسیت و ۹۷٪ اختصاصیت (۱۴) و با در

طرح، که خود را ملزم به حفظ کامل اسرار بیمار می‌دانند، بود. با استفاده از نرم‌افزار آماری MED cal نسخه‌ی ۱۸/۹ حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری تشخیص کله‌سیستیت حاد توسط سونوگرافی محاسبه شد و دامنه‌ی اطمینان ۹۵٪ برای شاخص‌های تشخیصی گزارش گردید.

یافته‌ها

در این مطالعه ۱۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که کمترین و بیشترین سن میان آن‌ها به ترتیب ۳۵ و ۸۵ سال بود. میانگین سنی این بیماران $53/62 \pm 12/27$ بود. ۳۱ نفر (۳۱٪) مرد و ۶۹ نفر (۶۹٪) زن مورد بررسی قرار گرفتند. ۲۲ نفر (۲۲٪) به صورت اورژانسی و ۷۸ نفر (۷۸٪) به صورت الکتیو بستری شده بودند. سیر بیماری ۱۵ نفر (۱۵٪) به صورت حاد و ۸۵ نفر (۸۵٪) به صورت مزمن بود. با توجه به جدول پایین در ۸۹ بیمار (۸۹٪) وجود سنگ صفرای گزارش شده و در ۵۶ نفر (۵۶٪) یافته‌های پاتولوژی مثبت و در ۴۴ نفر (۴۴٪) یافته‌های پاتولوژی منفی گزارش شد.

نظر گرفتن شیوع بیماری برابر با ۵۰٪ برابر با ۷۱ نفر تخمین زده شده و نهایتاً با در نظر گرفتن ریزش‌های احتمالی تعداد نمونه ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شد و کلیه‌ی افراد به صورت سرشماری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. معیارهای پذیرش نمونه‌ها شامل تمام موارد کله‌سیستیت حاد، سنگ کیسه‌ی صفرای علامت‌دار و پانکراتیت صفرای، که تحت کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپی قرار گرفته‌اند، بود و معیارهای حذف نمونه‌ها شامل پرونده‌های ناقص بود. بعد از تصویب طرح و اخذ کد اخلاق از کمیته‌ی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، هماهنگی با بیمارستان و موافقت کادر درمان، کلیه‌ی پرونده‌های بیماران مراجعه‌کننده به بخش جراحی که در طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ تحت کله‌سیستکتومی قرار گرفته بودند و بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه، سن، جنس، نتیجه‌ی سونوگرافی، نتیجه‌ی آزمایش پاتولوژی بافت کیسه‌ی صفرای (به‌عنوان استاندارد طلایی برای تعیین کله‌سیستیت)، وجود سنگ صفرای، سیر کله‌سیستکتومی، جراحی اورژانسی یا الکتیو استخراج شده و وارد چک لیست شدند. تمامی اطلاعات به دست آمده تنها قابل دسترسی مجریان

جدول ۱: متغیرهای دموگرافیک بیماران

متغیر	تعداد	تعداد	درصد
جنس	مرد	۳۱ نفر	۳۱٪
	زن	۶۹ نفر	۶۹٪
سن	میانگین	کمترین	بیشترین
	$53/62 \pm 12/27$ سال	۳۵ سال	۸۵ سال
نوع مراجعه	الکتیو	۲۲ نفر	۲۲٪
	اورژانسی	۷۸ نفر	۷۸٪
سیر کله سیستیت	حاد	۱۵ نفر	۱۵٪
	مزمن	۸۵ نفر	۸۵٪
وجود سنگ	داشته است	۸۹ نفر	۸۹٪

نداشته است	۱۱ نفر	۱۱٪
مثبت	۵۰ نفر	۵۰٪
منفی	۵۰ نفر	۵۰٪
مثبت	۵۶ نفر	۵۶٪
منفی	۴۴ نفر	۴۴٪

جدول ۲: تعیین حساسیت سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران

جمع کل	پاتولوژی		تعداد	مثبت	سونوگرافی
	مثبت	منفی			
۵۰	۴۶	۴	۴۶	۹۲٪	۵۰٪
۵۰	۱۰	۴۰	۱۰	۲۰٪	۵۰٪
۱۰۰	۵۶	۴۴	۵۶	۵۶٪	۱۰۰٪
درصد	۵۶٪	۴۴٪			۵۶٪

شهید بهشتی قم در طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بود. در این مطالعه میزان حساسیت سونوگرافی ۸۲/۱٪ برآورد شد. ارزش اخباری مثبت سونوگرافی ۹۰/۱٪ در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران، ارزش اخباری منفی سونوگرافی ۹۲٪ در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران و صحت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران ۸۶٪ برآورد شد. در مطالعه‌ی مشابه گوستافسون و همکاران در سال ۲۰۱۸ هدف بررسی صحت تشخیصی سونوگرافی توسط جراح در تشخیص کوله سیستیت حاد بود که حساسیت، ویژگی و دقت در ارتباط با تشخیص جراح و رادیولوژیست به ترتیب ۶۰/۰٪، ۸۰/۰٪، ۹۸/۶٪، ۹۷/۸٪، ۹۳/۹٪ و ۹۵/۶٪ بود. براساس نتایج این مطالعه حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ‌های صفراوی قابل اعتماد برآورد شد (۱۳). ورتز و همکاران در سال ۲۰۱۸ مطالعه‌ی گذشته‌نگری با هدف مقایسه‌ی دقت تشخیصی سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن در ارزیابی کوله-

بر اساس یافته‌های جدول بالا، با توجه به دامنه‌ی اطمینان ۹۵٪ و اینکه استاندارد طلایی در این مطالعه یافته‌های پاتولوژی بیماران بوده است، میزان حساسیت و ویژگی سونوگرافی به ترتیب ۸۲/۱٪ و ۹۰/۱٪ برآورد شد. ارزش اخباری مثبت سونوگرافی ۹۲٪ در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران و ارزش اخباری منفی سونوگرافی ۸۰٪ در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران و صحت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کله سیستیت حاد بیماران ۸۶٪ برآورد شد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به شیوع کله سیستیت حاد و اهمیت روش‌های تصویربرداری از جمله سونوگرافی و سی تی اسکن در تشخیص صحیح کله سیستیت حاد، هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی US در تشخیص کله سیستیت حاد با توجه به یافته‌های حین عمل و یافته‌های پاتولوژیکی در مرکز آموزشی درمانی

پاتولوژی به عنوان تشخيص قطعی مقایسه شدند. ارزش پیشگویی مثبت یا حساسیت WBC با $1/56$ ، آلکالین فسفاتاز با $2/34$ ، AST با $5/37$ ، ALT با 50 ، بیلی‌روبین مستقیم با $4/77$ ، بیلی‌روبین غیرمستقیم با $1/62$ و سونوگرافی در $2/96$ بود. بنابراین با توجه به سهولت دسترسی به سونوگرافی و مقادیر آنزیم‌های کبدی و نیز مقادیر به‌دست‌آمده در این پژوهش، می‌توان از این روش‌ها در تشخيص دقیق کله‌سیستیت استفاده کرد (۱۵)؛ که در این مطالعه‌ی مطالعات آزمایشگاهی، به علت ناقص بودن اکثر پرونده‌ها مقایسه‌ی یافته‌های آزمایشگاهی صورت نگرفت.

تشکر و قدردانی

این پژوهش حاصل پایان‌نامه‌ی دکتری عمومی با کد IR.MUQ.REC.1397.158 می‌باشد. در آخر از حمایت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و کلیه‌ی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر می‌نمایم.

سیستیت حاد انجام دادند؛ که در آن از ۵۶ نفر مبتلا به این بیماری، ۴۸ مورد تحت سی تی اسکن و ۴۲ نفر تحت هر دو آزمایش قرار گرفتند. برای مدت مشابه، ۶۰ بیمار بدون کله‌سیستیت حاد در آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفته و ۶۰ بیمار بدون کله‌سیستیت حاد تحت سی تی اسکن قرار گرفتند و این مطالعات تصویربرداری به عنوان مطالعات مقایسه‌ای انجام شدند. حساسیت سی تی اسکن برای تشخيص کله‌سیستیت حاد به طور معنی‌داری بیشتر از US بود (85% در مقابل 68%). با این حال، مقادیر پیش‌بینی منفی سی تی اسکن و سونوگرافی به طور قابل توجهی تفاوت نداشت (90% در مقابل 77%). از آنجا که هیچ مثبت کاذبی وجود نداشت، خصوصیات و ارزش پیش‌بینی مثبت برای هر دو روش 100% بود. در میان ۴۲ بیمار تحت سی تی اسکن و سونوگرافی، در ۲۵ بیمار هم سی تی اسکن و سونوگرافی مثبت، در ۱۰ بیمار سی تی اسکن مثبت و سونوگرافی منفی، در ۲ بیمار سی تی اسکن منفی و سونوگرافی مثبت و در ۵ بیمار نتیجه هر دو آزمایش منفی بود. سی تی اسکن برای تشخيص کله‌سیستیت حاد نسبت به سونوگرافی بسیار حساس‌تر بود. سی تی اسکن و سونوگرافی مکمل یکدیگر بوده و در صورت بالا بودن شک بالینی در مورد کله‌سیستیت حاد و همچنین منفی بودن اولیه آزمایشات، سایر مداخلات بالینی بالقوه باید مورد توجه قرار گیرند (۹). در مطالعه‌ای که مدملی و همکاران در سال ۱۳۹۶ (۱۴) با هدف بررسی ارزش پیشگویی مثبت نتایج آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخيص کله‌سیستیت حاد انجام دادند، یافته‌های آزمایشگاهی شامل تعداد لوکوسیتها، مقادیر (AST¹) و (ALT²)، آلکالین فسفاتاز، بیلی‌روبین مستقیم و غیرمستقیم خون و مطالعه‌ی سونوگرافی با نتیجه‌ی

1- Aspartate Aminotransferase Test

References

- 1- Gutt C. Acute cholecystitis: primarily conservative or operative approach? *Der Chirurg; Zeitschrift für alle Gebiete der operativen Medizin*. 2013;84(3):185-90.
- 2- Murata A, Okamoto K, Matsuda S, Kuwabara K, Ichimiya Y, Matsuda Y, et al. Multivariate analysis of factors influencing length of hospitalization and medical costs of cholecystectomy for acute cholecystitis in Japan: a national database analysis. *The Keio journal of medicine*. 2013:2012-0015-OA.
- 3- Pinto A, Reginelli A, Cagini L, Coppolino F, Ianora AAS, Bracale R, et al. Accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute calculous cholecystitis: review of the literature. *Critical ultrasound journal*. 2013;5(S1):S11.
- 4- Wertz JR, Lopez JM, Olson D, Thompson WM. Comparing the diagnostic accuracy of ultrasound and CT in evaluating acute cholecystitis. *American Journal of Roentgenology*. 2018;211(2):W92-W7.
- 5- Brunnicardi FC. *Schwartz's principles of surgery* 2015.
- 6- Demarchi MS, Regusci L, Fasolini F. Electrocardiographic changes and false-positive troponin I in a patient with acute cholecystitis. *Case reports in gastroenterology*. 2012;6(2):410-4.
- 7- Charalel RA, Jeffrey RB, Shin LK. Complicated cholecystitis: the complementary roles of sonography and computed tomography. *Ultrasound quarterly*. 2011;27(3):161-70.
- 8- Khan PS, Dar LA, Hayat H. Predictors of mortality and morbidity in peritonitis in a developing country. *Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi*. 2013;29(3):124.
- 9- Tez S, Tez M. Diagnosis of acute cholecystitis: clinical, radiologic, or both? *American Journal of Roentgenology*. 2018;211(4):W203-W.
- 10- Kaoutzanis C, Davies E, Leichtle SW, Welch KB, Winter S, Lampman RM, et al. Abdominal ultrasound versus hepato-imino diacetic acid scan in diagnosing acute cholecystitis-what is the real benefit? *Journal of Surgical Research*. 2014;188(1):44-52.
- 11- savaddar f, kachoeie a, bahadorzadeh m, vahedian m, noori e, amirkanian f, et al. Investigation of the relationship between gallstone wall thickness before surgery of cholecystectomy Laparoscopic and the rate of conversion to open surgery. *Jundishapur Scientific Medical Journal*. 2019;18(3): 225-31.
- 12- Van Randen A, Laméris W, Luitse JS, Gorzeman M, Hesselink EJ, Dolmans DE, et al. The role of plain radiographs in patients with acute abdominal pain at the ED. *The American journal of emergency medicine*. 2011; 29(6): 582-9. e2.
- 13- Fagenholz PJ, Fuentes E, Kaafarani H, Cropano C, King D, de Moya M, et al. Computed tomography is more sensitive than ultrasound for the diagnosis of acute cholecystitis. *Surgical infections*. 2015;16(5):509-12.
- 14- Madmoli Y, Bigdeli shamloo MB, Mahmoodi kouhi A, Shabgard F, Ahmadi N, Maniey M. An Investigation of the Sensitivity of Laboratory Tests and Sonography Results in Diagnosis of Acute Cholecystitis in One of the Dezful Hospitals in 2014-15. *J ParaMed Sci & Rehabil*. 2017; 6(1): 58-64.
- 15- Kohli R, Bansal E, Gupta AK, Matreja PS, Kaur K. To study the levels of C - reactive protein and total leucocyte count in patients operated of open and laparoscopic cholecystectomy. *J Clin Diagn Res*. 2014; 8(6): P 62-9..

Determination of the Ultrasound Sensitivity and Specificity in the Diagnosis of Acute Cholecystitis

Ahmad Kachoei¹, Saied Madani¹, Mostafa Vahedian², Fatemeh Amirkanian³, Enayatollah Noori^{*3}, Mohammadmahdi Shater⁴, Maryam Balighi³

1- Department of Surgery, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

2- PhD in Epidemiology, Clinical Research Development Center (CRDC), Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

3- Student Research Committee of Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

4- Department of orthopedic surgery, Baqiyatollah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Corresponding Author: E-mail: enoori@muq.ac.ir

<https://orcid.org/0000-0002-4457-129X>

Abstract

Background and Aim: Acute cholecystitis is one of the most common surgical problems amongst the patients with abdominal pain. The purpose of this study was to determine the ultrasound (US) sensitivity and specificity in the diagnosis of acute cholecystitis according to the surgical and pathological findings at Shahid Beheshti Hospital (Qom, Iran) between 2016 and 2017.

Material and Method: The statistical population of this cross-sectional study included all patients with acute cholecystectomy referred to Shahid Beheshti Hospital whom underwent cholecystectomy between 2016 and 2017. In this study, census sampling was done. Based on the including and excluding criteria of the study, age, sex, sonography result, pathological examination, presence of gallstones, cholecystectomy, emergency and elective surgery were extracted from the files and entered the checklist. Sensitivity, specificity and predictive value of US were calculated by using sensory software 18.9 MEDcal for acute cholecystitis. And 95% confidence interval for diagnostic indices was reported.

Results: 31 patients (31%) were male and 69 (69%) were female. And the mean age of these patients was 53.62 ± 12.27 . 89 cases (89%) had gallstones. Pathologic findings were positive in 56 (56%) patients and 44 (44%) had negative pathological findings. Furthermore, the sensitivity and specificity of US were estimated to be 82.1% and 90.1%, respectively. The positive and negative predictive values of ultrasonography were (92%) and (80%) respectively, in the diagnosis of acute cholecystitis. Additionally, the diagnostic accuracy of ultrasonography was 86% in diagnosis of acute cholecystitis.

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that ultrasound has a high diagnostic accuracy in diagnosis of acute cholecystitis in patients.

Keywords: Acute cholecystitis, Diagnostic accuracy, Ultrasound